


SIMPTOMI TOPLINSKOG UDARA U PSA

- dahtanje ili teško disanje
- pretjerano slinjenje (hipersalivacija)
- pas je topao na dodir
- suh nos
- povišena temperatura (iznad 39 °C)
- promijenjena boja desni
- ubrzani otkucaji srca
- povraćanje
- bezvoljnost i slabost
- teturanje
- prestanak mokrenja
- krv u stolici
- drhtanje
- nemogućnost da ustane



- premjestite psa na hladno/sjenovito mjesto
- odmah ga polijte hladnom (ali ne ledenom) vodom kako ne bi pao u stanje šoka, i činite to dok ne počne normalnije disati, no pazite da ne počne drhtati
- možete ga i umotati u mokre ručnike ili ga hladiti ventilatorom
- dajte mu da pije (male!) količine hladne vode
- kad se dovoljno rashladi, **ODMAH** ga odvedite najbližem veterinaru!

ŠTO UČINITI

KAKO SPRIJEČITI

- **nikada** ne ostavljajte psa zatvorenog u automobilu ili nekom drugom prostoru koji se može brzo zagrijati
- nemojte ga izlagati velikim naporima pri velikoj vrućini
- uvijek mu omogućite pristup vodi, dobro prozračenim prostorijama ili sjenovitim mjestima
- polijevajte ga vodom da se rashladi

